

# FENTANILO:

## UNA SOLA PÍLDORA PUEDE MATAR

El fentanilo, producido ilegalmente, domina el suministro ilegal de drogas en las calles. Causa un número récord de muertes por drogas en los Estados Unidos.

# 200

Más de 200 personas mueren cada día a causa de sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo.

### TRES INDICIOS PRINCIPALES DE UNA SOBREDOSIS



Respiración muy lenta, irregular o nula



Labios y uñas azules, moradas o grises



Falta de respuesta al dolor (frote del esternón)

Entre otros indicios se incluyen los siguientes: Pupilas diminutas, sonidos de asfixia o un gorgoteo similar a un ronquido.

Las píldoras falsas se producen para parecerse a muchos tipos diferentes de píldoras recetadas, como:

- oxidocona (Oxycontin® Percocet®)
- hidrocodona (Vicodin®)
- alprazolam (Xanax®)
- otros estimulantes, como anfetaminas (Adderall®)



Percocet real



Percocet falso

### ¿Qué puedo hacer?

Asegúrese de hablar con sus hijos sobre los peligros del fentanilo y nunca tomen un medicamento que no les haya recetado un médico y que no hayan recogido de una farmacia de confianza.

### Sobredosis inversa de opioides con naloxona

¿Conoce a alguien en riesgo de sobredosis? Escanee el código QR a continuación para más información sobre la naloxona.



[childrensmercy.org](https://childrensmercy.org)