

Instrucciones para los niños que podrían tener sarampión y las personas que viven con ellos

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y fácil de transmitir:

- Si 10 personas que no han recibido la vacuna contra el sarampión están cerca de una persona con sarampión, 9 de ellas se enfermarán.
- El sarampión se propaga por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda.
- Los gérmenes pueden permanecer en el aire durante 2 horas.
- El sarampión puede comenzar de 7 a 14 días después de estar cerca de alguien enfermo y puede causar lo siguiente:
 - Fiebre alta
 - Tos
 - Goteo nasal
 - Ojos rojos o llorosos
 - Sarpullido que aparece de 3 a 5 días después de los otros síntomas

Qué hacer después de salir del hospital o clínica:

- 1 Vaya directamente a casa y permanezca ahí hasta que el Departamento de Salud le indique los próximos pasos.
- 2 En el trayecto a casa:
 - Todas las personas que viven en su hogar deben usar mascarilla cuando estén cerca de otras personas.
 - Esto incluye cuando viajan en autobuses o automóviles.

Próximos pasos:

- 1 Llame a su médico o al Departamento de Salud local para averiguar quién necesita medicamentos para prevenir el sarampión.
- 2 Si su hijo o alguien en su hogar necesita ver a un médico o empeora, llame al médico u hospital antes de acudir a la consulta.

Escanear para verlo en un dispositivo móvil:

