

Instrucciones para el paciente después de la dosis de prueba con amoxicilina

En el día de hoy, su hijo recibió una pequeña cantidad de un medicamento llamado amoxicilina. No tuvo una reacción grave, como dificultad para respirar o hinchazón.


Qué observar hoy:

- Observe a su hijo durante 6 horas después de tomar el medicamento. Si aparece una erupción o parece estar enfermo, llame al lugar donde recibió el medicamento o a la Línea de asesoramiento de enfermería de Children's Mercy al 816-234-3188.
- Si aparece una erupción leve después de las 6 horas, puede darle una dosis de Benadryl o Zyrtec infantil. Sigue observándolo. Si los síntomas empeoran, llame al médico de su hijo o a la Línea de asesoramiento de enfermería de Children's Mercy.
- En casos muy poco frecuentes, podrían surgir problemas más adelante. Si nota alguno de estos síntomas en las próximas semanas, llame al médico de inmediato:
 - Ampollas en los labios o la piel.
 - Descamación de la piel.
 - Articulaciones hinchadas.

Qué ocurre después

Si su hijo toleró bien la dosis de prueba, puede volver a tomar este tipo de medicamento (por ejemplo, amoxicilina, ampicilina, amoxicilina con clavulanato [Augmentin®] o penicilina).

- Es posible que aparezca una erupción leve después de algunas dosis o que se sienta mal (como vómitos o diarrea).
- Puede seguir tomando el medicamento a pesar de estos síntomas.



Vaya a la sala de emergencias o llame al 911 si su hijo:

- No puede respirar.
- Tiene la cara o la garganta hinchadas.
- Presenta una erupción con ronchas que pican por todo el cuerpo.
- Vomita muchas veces.

Llame al médico habitual de su hijo si:

- Usted tiene dudas o está preocupado.