

Su prueba de detección del VIH (virus de la inmunodeficiencia humana)

Nombre de la prueba: prueba de detección de antígenos/anticuerpos del VIH

Plazo: los resultados estarán listos en 7 días.

Próximo paso: lo llamaremos para hablar sobre los próximos pasos y proporcionarle una derivación, independientemente de los resultados. Indíquenos un número de teléfono donde podamos comunicarnos con usted. Además, proporciónenos el número de teléfono de una persona de su confianza.

¿Qué significa un resultado negativo?

- La prueba de detección del VIH que le realizaron busca indicios de que su organismo está combatiendo el VIH.
- Es posible que la prueba tarde entre 3 y 12 semanas *después* de la exposición en dar positivo.
- Si estuvo expuesto al VIH en las últimas 3 a 12 semanas, la prueba de hoy podría dar negativo.

Si vuelve a hacerse la prueba 12 semanas después de la exposición y el resultado sigue siendo negativo, no tiene VIH.

Si se expone al VIH después de la prueba de hoy, podría infectarse aunque la prueba de hoy haya dado negativo.

¿Qué sucede si el resultado es positivo?

Si el resultado de la prueba es positivo, haremos lo siguiente:

- Solicitaremos más pruebas.
- Programaremos otra consulta para hablar sobre los resultados.
- Lo ayudaremos a planificar la atención médica que necesite.

Es posible que esta situación le genere distintas emociones. Con un tratamiento temprano, las personas con VIH pueden tener una esperanza de vida similar a la de las personas sin VIH. Su equipo de Children's Mercy le brindará la atención médica y el apoyo que necesite.

Programe una consulta con su PCP

- Después de recibir los resultados de la prueba de detección del VIH, programe una consulta con su proveedor de atención primaria (Primary Care Provider, PCP), independientemente del resultado. Si no tiene un PCP, llame a la Clínica de Medicina para Adolescentes y Adultos Jóvenes de Children's Mercy al (816) 960-4152.
- Durante la consulta, hable sobre:
 - Pruebas: programe pruebas de detección del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
 - Medicamentos: para ayudar a prevenir o tratar el VIH.
 - Métodos anticonceptivos
 - Decisiones saludables sobre la sexualidad y las relaciones

Es conveniente **hacerse la prueba al menos una vez al año** si:

- Tiene relaciones sexuales sin condón.
- Es un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres.
- Tiene relaciones sexuales con más de una persona desde su última prueba de detección del VIH.
- Tiene relaciones sexuales con una persona cuyos antecedentes sexuales desconoce.
- Tiene relaciones sexuales a cambio de dinero o drogas.
- Contrae alguna infección de transmisión sexual.
- Se inyecta drogas.

Obtenga más información sobre el VIH

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC): <https://www.cdc.gov/hiv/index.html>
- Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: <https://www.cdc.gov/hiv/es/vih.html>