



Children's Mercy

Usando un Inhalador con Espaciador


Un inhalador es usado para llevar medicina adentro de los pulmones. Es recomendado usar un espaciador (Aerochamber®) con el inhalador.

La Boquilla con el Espaciador


<p>1</p> <p>Siéntese con su hijo en las piernas. Sostenga al niño.</p> 	<p>2</p> <p>Agite bien el inhalador por (2-3 segundos).</p> 
<p>3</p> <p>Quite la tapa del inhalador, y coloque el inhalador en la parte posterior del espaciador.</p> 	<p>4</p> <p>Coloque la máscara contra la cara de su hijo. Asegúrese de sellar bien la máscara sobre la boca y nariz.</p> 
<p>5</p> <p>Empuje hacia abajo el inhalador, liberando 1 soplo en el espaciador.</p> 	<p>6</p> <p>Mantenga la máscara firmemente sobre la nariz y boca, y cuente por 5-10 respiraciones (20-30 segundos).</p> <p>Quite la máscara de la cara, espere 30 segundos, y repita los pasos 2-6 para más inhalaciones según, sea prescrito.</p> 

Limpieza de Espaciador


Limpie su espaciador una vez a la semana o antes si fuera necesario.
La limpieza habitual va a prevenir que se acumule el polvo dentro del espaciador.




1. Retirar la pieza de goma situada en la parte de atrás.



2. Poner las dos partes a remojar en agua tibia y jabón líquido durante 15 minutos. Mover con cuidado. No frotar por dentro. Enjuagar.



3. Dejar secar al aire en posición vertical. No secar.



4. Volver a colocar la pieza de atrás.

Preparar los inhaladores

(atomización de prueba)

es importante para poder suministrar la dosis apropiada de medicina.

Nombre	Preparación (atomización de prueba)
Ventolin® (albuterol)	Si lo usa por primera vez, prepare hacienda cuatro atomizaciones de prueba. Vuelva a preparar de Nuevo con cuatro atomizaciones si no la ha usado en dos semanas o si ha dejado de usarlo por un tiempo.
ProAir® (albuterol)	Si lo usa por primera vez, prepare hacienda tres atomizaciones de prueba. Haga tres atomizaciones si no la ha usado en tres días.
Proventil® (albuterol)	Si lo usa por primera vez, prepare hacienda cuatro atomizaciones de prueba. Vuelva a preparar de Nuevo con cuatro atomizaciones si no la ha usado en dos semanas.
Xopenex® (levalbuterol)	Si lo usa por primera vez, prepare hacienda cuatro atomizaciones de prueba. Vuelva a preparar de Nuevo con cuatro atomizaciones si no la ha usado en dos semanas o si ha dejado de usarlo por un tiempo.